INSTRUCTIONS POST-OPERATOIRES

Vous avez eu un TRAITEMENT ENDODONTIQUE (traitement de racines) Veuillez suivre les recommandations suivantes :

Par ce traitement, le nerf de la dent a été enlevé. La dent est toujours là et sera conservée, mais vous n'aurez plus de sensations douloureuses.



- Votre traitement des racines est maintenant terminé. Les canaux dentaires ont été vidés, désinfectés puis hermétiquement obturés.
- Les effets de l'anesthésie vont disparaître dans 1 à 4 heures. Faites attention de ne pas vous mordre la joue tant que vous ressentez l'anesthésie.
- Evitez de manger sur la dent traitée ; laissez le pansement durcir jusqu'au soir.
- II est normal que votre dent soit sensible durant 2 à 5 jours.
- Une sensibilité à la mastication va normalement persister deux à trois semaines pour disparaître ensuite progressivement.
- En cas de douleur, nous vous recommandons de prendre 400 mg d'Ibuprofène (Advil, Spifen, Nurofen,...) toutes les 6 heures pendant deux à trois jours suivant le traitement, si vous n'êtes pas allergique à ce médicament.
- Un gonflement ou une douleur non calmé par l'Ibuprofène n'est pas normal. Contactez notre cabinet car des antibiotiques seront alors certainement nécessaires.
- Un pansement provisoire a été placé sur votre dent. Il va progressivement se désagréger. II est important de procéder sans tarder à la restauration définitive. La bonne conservation de la dent en dépend.
- Pour toute question ou en cas d'urgence n'hésitez pas à contacter le cabinet au : 03 88 48 80 01.